



Changements aux médicaments lors des journées de maladie pour le diabète de type 2

Si vous êtes malade, avez des vomissements ou de la diarrhée et que vous ne pouvez pas vous hydrater suffisamment, certains médicaments peuvent endommager vos reins ou causer d'autres effets secondaires.

Si vous n'êtes pas capable de boire suffisamment pour vous hydrater, vous devriez cesser les médicaments suivants :

•Médicaments pour le diabète :

metformine (Glucophage)

inhibiteurs de SGLT2 : canagliflozine (Invokana), dapagliflozine (Forxiga), empagliflozine (Jardiance)

glyburide (Diabeta), gliclazide (Diamicron), glimépiride (Amaryl)

•Comprimés pour traiter l'hypertension artérielle (haute pression)

•Diurétiques (médicaments qui aident à éliminer l'eau) comme le furosémide (Lasix)

Recommencer à prendre ces médicaments seulement lorsque vous pouvez manger et boire normalement.

Veuillez ne pas prendre d'anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) comme l'ibuprofène (Advil, Motrin) célécoxib (Celebrex), naproxène (Aleve) et des médicaments contre la grippe qui contiennent des AINS puisque ces médicaments peuvent aussi endommager vos reins. Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre des médicaments en vente libre.

Vérifiez plus souvent votre glycémie (taux de sucre dans le sang) et appelez votre équipe de gestion du diabète si vous avez des inquiétudes ou des questions.