



Instructions à suivre après une échographie endobronchique

Alimentation :

Pour ne pas courir le risque de vous étouffer, ne buvez et ne mangez pas pendant deux heures après l'anesthésie. Votre médecin ou l'infirmière vous dira quand vous pourrez prendre une gorgée d'eau froide et, si vous le tolérez, vous pourrez recommencer à manger à h .

Après l'intervention :

- Vous pourriez avoir mal à la gorge ou avoir la voix rauque pendant quelque temps après que l'effet de l'anesthésique aura disparu. Pour vous aider à vous sentir mieux, vous pouvez :
 - sucer des pastilles
 - vous gargariser la gorge avec de l'eau salée
 - boire des boissons chaudes.
- Vous pourriez avoir un peu de fièvre pendant 24 heures.
- Vous pourriez avoir des expectorations (crachats) de mucus rosâtres (teintés de sang).

Avisez votre médecin ou rendez-vous à l'urgence la plus proche si vous avez les symptômes suivants :

- essoufflement ou douleur à la poitrine
- crachats de plus d'une cuillerée à thé de sang
- fièvre ou frissons après 24 heures
- étourdissements et évanouissement.

Après la sédation :

- Quelqu'un doit vous raccompagner à la maison.
- Il ne faut pas conduire de véhicule motorisé ou faire fonctionner de la machinerie lourde. Il ne faut pas non plus consommer d'alcool. Ne prenez pas de décisions juridiques pendant 24 heures après l'intervention.
- Vous pouvez retourner au travail le jour suivant.
- Vous pouvez reprendre vos activités normales le jour suivant.