

2016 Gestion de la tuberculose


Pourquoi tenons-nous absolument à vous faire revoir cette matière?

Votre santé et celle de nos patients nous tiennent à cœur!

Objectifs de la formation

À la fin de ce module, vous saurez :

- indiquer de quelles manières la tuberculose se transmet
- nommer l'équipement de protection individuelle ÉPI que vous devez porter lorsque vous travailler avec des patients atteints de tuberculose active
- énumérer les étapes à suivre pour intervenir en cas d'exposition à un patient atteint de TB infectieuse



3.2

Politique de gestion de la tuberculose

L'Hôpital a une politique de gestion de la tuberculose et un programme de gestion de la tuberculose.

Voici leurs objectifs :

- Protéger tout employé de l'Hôpital contre une infection au *Mycobacterium tuberculosis* au travail
- S'assurer qu'avant de commencer à travailler à l'Hôpital, tout nouvel employé passe un test de dépistage de la TB infectieuse
- S'assurer que tout employé qui est exposé à un patient atteint de TB infectieuse passe un test de dépistage de suivi approprié



3.3

Qu'est-ce que la tuberculose (TB)?



La TB est une maladie causée par la bactérie *Mycobacterium tuberculosis*

Elle s'attaque habituellement aux poumons, mais la **TB infectieuse active** peut toucher d'autres parties du corps comme les reins, la colonne vertébrale et le cerveau

Quand la **TB infectieuse active** se loge dans les poumons ou le larynx, on parle de tuberculose respiratoire; une personne atteinte de TB respiratoire est contagieuse et peut transmettre des bactéries tuberculeuses à d'autres personnes

3.4

La gestion de la tuberculose

Comment une personne peut-elle contracter la tuberculose?

La bactérie de la tuberculose est transportée sur des particules en suspension dans l'air quand une personne infectée par la TB respiratoire active

- touse
- éternue
- parle

Ces particules projetées dans l'air peuvent aussi être transportées lors d'une "intervention médicale qui génère des aérosols"

- L'infection se transmet quand une personne susceptible inhale des particules aéroportées qui contiennent la bactérie de la tuberculose

3.5

Dépistage de la tuberculose positif

Que faire si j'ai eu un test de dépistage positif par le passé?

Selon la politique de l'Hôpital sur le Programme de gestion de la tuberculose: le personnel dont un test de dépistage de la tuberculose est positif doit en informer le Service de santé et de mieux-être au travail et lui signaler la survenue de tout signe ou symptôme de la tuberculose.

Signes ou symptômes de la tuberculose sont:

- Toux
- Fièvre
- Sudation nocturne
- Fatigue
- Perte d'appétit
- Perte de poids



3.6

Infection tuberculeuse latente

Est-ce toute personne qui est infectée par la tuberculose est contagieuse?

Non... Certaines personnes sont infectées par le bacille de la tuberculose, mais ne deviennent jamais malades et ne développent pas la tuberculose active; c'est ce qu'on appelle une infection tuberculeuse latente

Une personne ayant une infection tuberculeuse latente n'est pas contagieuse et ne peut pas contaminer d'autres personnes



3.7

Prévention et Protection:

Comment empêcher la propagation de la tuberculose infectieuse et comment se protéger

Isolement du patient

- À l'Hôpital, tout patient qui a ou qui pourrait avoir la TB infectieuse est placé dans une chambre d'isolement des infections aéroportées

Équipement protecteur personnel

- Tout fournisseur de soins doit porter un masque N95 quand il prend soin d'un patient qui a ou qui pourrait avoir la TB infectieuse



Test de cutané de la tuberculose (TCT)

TCT et nouvel employé

Test de dépistage de la tuberculose avant de commencer à travailler à l'Hôpital

Tout nouvel employé a **14 jours** après la séance d'orientation pour subir un test cutané à la tuberculine (TCT). Santé et de mieux-être au travail administre le test pour les employés, les bénévoles, le personnel médical, les médecins et les travailleurs contractuels. Tout membre du personnel ayant un résultat positif sera dirigé à Santé professionnelle et mieux-être au travail pour un suivi.

TCT annuel requis

Test cutané à la tuberculine annuel

Suite à la politique du programme de la gestion de la tuberculose,

- tout travailleur de la santé
- tout le personnel des services de soutien qui travaille à l'Entretien ménager, au Service de nutrition et d'alimentation ou au Transport
- ainsi que tout le personnel administratif en contact avec des patients

à l'Hôpital ou à l'Institut de cardiologie doit passer un test cutané à la tuberculine avant le deuxième lundi de février chaque année.



Si vous n'avez jamais subi le test cutané de la tuberculose (TCT), cliquez ici pour prendre connaissance de la procédure à suivre.

Test cutané à la tuberculine (TCT)

Le TCT, parfois appelé aussi « test de Mantoux », consiste à injecter une petite quantité de sérum sous la peau de l'avant-bras. Une petite bosse se formera et disparaîtra en une journée. Vous devez revenir au bureau de Santé et mieux-être au travail pour la « lecture » du test : l'infirmière ou le médecin vérifie si avez réagi au sérum.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec **l'infirmière de santé au travail** de votre secteur.

Exposition à la TB - définition

La politique sur le [Programme de gestion de la tuberculose](#) définit ainsi l'exposition :

On entend par **exposition à la tuberculose** un contact direct avec un patient atteint de tuberculose ou le fait d'être dans la même pièce que lui sans porter de masque N95 bien ajusté.



3.10

Intervention en cas d'exposition

Qu'arrive-t-il si un membre du personnel est exposé à un patient atteint de TB?

Le bureau de la Santé professionnelle et mieux-être au travail avise le membre du personnel...

- Si on confirme qu'un patient a la TB infectieuse, Santé professionnelle et mieux-être au travail enverra un avis au personnel de l'Hôpital pour déterminer qui pourrait y être exposé

Que doit faire le membre du personnel?

- Tout employé exposé devra communiquer avec Santé professionnelle et mieux-être au travail ou se rendre au bureau de SST dans les 14 jours suivant l'avis pour déterminer s'il doit subir un test de dépistage de la tuberculose
- Tout employé avisé qui ne communique pas avec Santé professionnelle et mieux-être au travail dans les 14 jours suivant l'avis **ne sera pas** autorisé à travailler jusqu'à ce que le test de dépistage soit complété

3.11

Résumé

Test:

- Tout membre du personnel nouvellement embauché doit se rendre au bureau de Santé et mieux-être au travail pour passer ou fournir la preuve qu'il a passé un test cutané à la tuberculine dans les 14 jours suivant son embauche
- Le personnel identifié dans la politique sur la gestion de la tuberculose doit passer le TCT chaque année

Gestion du risque:

- La TB peut uniquement se contracter par des particules aéroportées
- Les membres du personnel qui travaillent avec des patients qui ont une TB active doivent porter un masque N95

Intervention en cas d'exposition:

- Si vous croyez avoir été exposé ou si Santé professionnelle et mieux-être au travail vous a avisé que vous pourriez avoir été exposé à un patient ayant la TB active, vous avez 14 jours pour vous rendre au bureau de Santé et mieux-être au travail pour passer un **test cutané à la tuberculine**
 - À défaut de quoi, il vous sera interdit de travailler à l'Hôpital

3.12

Politiques et procédures

Les politiques et procédures se trouvent dans la section Politiques et procédures de monHôpital.

TOH Today - TOH At A Glance - Policies and Procedures - TOH Teams Employee Services -

Policies and Procedures

Policy Search [Search]

Restrict to:

- Ambulatory Care
- Cardiorespiratory
- Clinical Administration
- Diagnostic Imaging
- Point of Care Testing
- Speech-Language Pathology

Utilisez la boîte de recherche pour trouver une politique.

Vous pouvez limiter votre recherche à des catégories spécifiques de politiques

4.1

La Fin